

ВАЖНО!

После проведенного эндодонтического лечения коронка зуба ослаблена. Для исключения образования сколов, трещин, перелома зуба рекомендуется восстановление зуба постоянной ортопедической конструкцией (коронкой) в сроки не более 1 месяца после постоянной пломбировки корневых каналов. Это позволит герметично закрыть доступ к корневым каналам, предотвратить их повторное инфицирование, укрепить ослабленные стенки зуба, полностью восстановить форму зуба и функцию жевания в целом.

**Пациент
всегда
должен
помнить,**

что результат стоматологической услуги (длительность его сохранения) зависит в значительной степени от того, насколько он сам заботится о своем здоровье в целом, и стоматологическом здоровье, в частности.

Памятку получил(а) на руки.

Подпись пациента: _____ /

_____ /

Дата: «__» ____ 20__ года.

НОВОДЕНТ
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

Рекомендации после эндодонтического лечения

После эндодонтического лечения могут быть:

- + Болевые ощущения в зубе. В основном это боль при накусывании, которая со временем проходит в срок от одних суток до месяца;
- + Онемение после обезболивания. На верхней челюсти оно длится до 3 часов, на нижней – до 6 часов. Важно в это время не есть, чтобы не прикусить губы, язык или щёки.
- + Ноющие боли после окончания анестезии. Так организм реагирует на вмешательство и наличие пломбировочного материала в канале зуба. Боль зависит также от имевшегося на начало лечения воспаления.

Рекомендации после эндодонтического лечения
вы можете ознакомиться и при необходимости

Если после эндодонтического лечения:

- + Боли усиливаются с течением времени;
- + Наблюдается отёк слизистой оболочки в области вылеченного зуба, отёк щеки;
- + Повышение температуры тела;
- + Выпала временная пломба;

Необходимо обратиться к лечащему врачу.

Телефон для записи:

99-10-01

При выпадении временной пломбы-повязки

необходимо закрыть полость ватным шариком, чтобы предотвратить попадание инфекции в корневые каналы.

После эндодонтического лечения рекомендуется:

- + Соблюдать все назначения лечащего врача;
- + При установке временной пломбы, необходимо воздержаться в течение 2-х часов от приёма пищи. До проведения постоянной реставрации постарайтесь ограничить приём жесткой пищи на вылеченной стороне, чтобы избежать скола стенок зуба или раскола зуба пополам.

Важно! В случае установки временной пломбы нельзя нарушать время повторной явки на приём, это может привести к осложнениям;

- + Нельзя греть зуб;
- + Сразу после лечения необходимо ограничить жевательную нагрузку на пролеченный зуб;
- + Регулярное наблюдение за зубом. Во время диспансерного наблюдения учитываются ваши ощущения и рентгенологическая картина в области зуба. В связи с чем, лечение каналов зуба предполагает обязательно повторное проведение рентгенологического обследования в области вылеченного зуба по следующей схеме (если лечащий врач не предложит другое): через 6, 12, 24 месяцев, далее — 1 раз в год;