

Рекомендации пациенту после местной анестезии

Реакции, которые возможны в течение суток:

1. болезненность в месте вколов;
2. онемение, покалывание в месте вколов, «мурашки», ощущение зуда в зоне анестезии;
3. отечность, припухлость;
4. слегка затрудненное открывание рта;
5. небольшая гематома на слизистой в месте вколов.

Эти реакции являются довольно распространенными, поэтому нет повода для беспокойства.

Чего не должно быть спустя двое суток и более после анестезии и что потребует участия врача:

1. аллергическая реакция — сыпь в полости рта или на теле, отек в месте вколов (следствие анестезии);
2. большой отек в месте вколов, большая гематома (следствие травмы кровеносных сосудов);
3. резкая боль в месте вколов;
4. повышенная температура;
5. повышение температуры;
6. повышение или понижение чувствительности анестезированной зоны;
7. затрудненное открывание рта.

Если у Вас появились перечисленные или иные настораживающие состояния, **СРОЧНО обратитесь к лечащему врачу.**

Какие меры предосторожности надо соблюдать в течение 1-2 суток спустя после анестезии

- 1.** Особо тщательная гигиена (для предупреждения инфицирования места вкola);

- 2.** Не курить и осторожно принимать пищу, чтобы не поперхнуться, не укусить язык, щеку, не обжечься горячим (ощущения могут быть нарушены).

Что можно сделать самому при проявлении боли (до посещения врача):

- 1.** Тщательно соблюдать гигиену полости рта;

- 2.** Ополаскивать рот дезинфицирующими растворами (фурацилин, хлоргексидин, ромашка, шалфей) – если полоскания не противопоказаны врачом;

- 3.** Принять анальгетики. Лучше всего на основе парацетамола. В остальных случаях надо посоветоваться с лечащим врачом.

На какие виды деятельности пациента может негативно повлиять анестезия в течение нескольких часов (не более суток):

- 1.** активная умственная деятельность - возможны замедленные реакции, рассеянность внимания;

- 2.** активная речевая деятельность - возможны затруднения в произношении слов, ухудшение дикции;

- 3.** вождение автомобиля (в случае увеличения дозы анестетика при большом объеме лечения - врач предупредит особо).

Особые рекомендации:

Памятку получил(а) на руки.

Подпись пациента: _____ / _____ /

Дата: «__»20__года.